

**Klucz do rodzaju *Pluteus* sekcja *Pluteus***  
(skompilowane na podstawie załączonych źródeł– Jakub Węclawski)

1) sprzążki obecne.....	2
1) sprzążek brak.....	13
2) kapelusz szary, niebieskawy lub zielonawy na drewnie drzew liściastych.....	<b>Pluteus salicinus</b>
2) kapelusz biały lub kremowy do ochrowego.....	3
2) kapelusz brązowy.....	4
3) na drewnie drzew liściastych.....	5
3) na drewnie drzew iglastych.....	12
4) na drewnie drzew liściastych.....	8
4) na drewnie drzew iglastych.....	9
5) sprzążki w większości sept.....	11
5) sprzążki w 10% sept .....	<b>Pluteus brunneoradiatus var albus</b>
8) sprzążki w 10% sept.....	<b>Pluteus brunneoradiatus</b>
8) sprzążki w większości sept .....	<b>Pluteus brunneidiscus</b> ( Ameryka i Hiszpania )
9) ostrze blaszek brązowe.....	<b>Pluteus atromarginatus</b>
9) ostrze blaszek nie brązowe.....	10
10) cheilocystydy do 60 µm długości.....	<b>Pluteus pouzarianus</b>
10) cheilocystydy do 200 µm długości .....	<b>Pluteus primus</b>
11) cheilocystydy do 70 µm .....	<b>Pluteus pellitus</b>
11) cheilocystydy do 100-120 µm.....	<b>Pluteus sandalioticus</b>
12) cheilocystydy do 60 µm długości.....	<b>Pluteus pouzarianus var albus</b>
12) cheilocystydy do 200 µm długości .....	<b>Pluteus primus var purus</b>
13) kapelusz brązowy.....	14
14) głównie drewno liściaste, zapach rzodkwi.....	<b>Pluteus cervinus</b>
14) drewno iglaste, warstwa lipidowa w hymenium, małe zarodniki.....	<b>Pluteus lipidocystis</b>
14) z cystydami 'magnus-type', zapach rzodkwi.....	<b>Pluteus cinerascens</b> (USA)
13) kapelusz biały i lub kremowy.....	15
15) zapach rzodkwi.....	<b>Pluteus cervinus var albus</b>
15) bez zapachu lub inny niż rzodkwi.....	16
17) cheilocystydy obecne i łatwe do znalezienia.....	18
18) zarodniki 6-9,5 × 4,5-7,0, cheilocystydy max 75 µm .....	<b>Pluteus nothopellitus</b>
18) zarodniki węższe 4-5(6), cheilocystydy w centrum blaszki większe .....	<b>Pluteus albineus</b>
17) cheilocystyd bardzo mało lub brak.....	<b>Pluteus petasatus</b> (incl. <b>Pluteus pseudorobertii</b> )

główne źródła:

Vellinga E. C. 1990. *Pluteus* In: C. Bas, Th. W. Kuyper, M. E. Noordeloos & E. C. Vellinga (eds), Flora Agaricina Neerlandica. Critical monographs on families of agarics and boleti occurring in the Netherlands. 2: 31–55. A. A. Balkema, Rotterdam.

Justo A. & Castro M. L. 2007. *Pluteus nothopellitus* sp. nov. and a review of white species in *Pluteus* section *Pluteus*. Mycotaxon 102: 221–230.

A. Justo & Castro M.L. 2007 Observations in *Pluteus* section *Pluteus* in Spain: two new records for Europe. Mycotaxon 102, 209–220

Błażej Gierczyk<sup>1</sup>, Anna Kujawa & Tomasz Ślusarczyk 2014  
*Pluteus albineus* (basidiomycota)– a new species for Poland. Polish Botanical Journal 59(1): 145–148.

Heilmann-Clausen J. 2008. *Pluteus* Fr. In: H. Knudsen & J. Vesterholt (eds), Funga Nordica. Agaricoid, boletoid and cyphelloid genera, pp. 535–538. Nordsvamp, Copenhagen.