

Klucz do rodzaju *Pluteus* sekcja *Pluteus*
(skompilowane na podstawie załączonych źródeł – Jakub Węclawski)

1) sprzążki obecne.....	2
1) sprzążek brak.....	13
2) kapelusz szary, niebieskawy lub zielonawy na drewnie drzew liściastych.....	<i>Pluteus salicinus</i>
2) kapelusz biały lub kremowy do ochrowego.....	3
2) kapelusz brązowy.....	4
3) na drewnie drzew liściastych.....	5
3) na drewnie drzew iglastych.....	12
4) na drewnie drzew liściastych.....	8
4) na drewnie drzew iglastych.....	9
5) sprzążki w większości sept.....	11
5) sprzążki w 10% sept	<i>Pluteus brunneoradiatus var albus</i>
8) sprzążki w 10% sept.....	<i>Pluteus brunneoradiatus</i>
8) sprzążki w większości sept	<i>Pluteus brunneidiscus</i> (Ameryka i Hiszpania)
9)ostrze blaszek brązowe.....	<i>Pluteus atromarginatus</i>
9) ostrze blaszek nie brązowe.....	10
10) cheilocystydy do 60 µm długości.....	<i>Pluteus pouzarianus</i>
10) cheilocystydy do 200 µm długości	<i>Pluteus primus</i>
11) cheilocystydy do 70 um	<i>Pluteus pellitus</i>
11) cheilocystydy do 100-120 um.....	<i>Pluteus sandalioticus</i>
12) cheilocystydy do 60 µm długości.....	<i>Pluteus pouzarianus var albus</i>
12) cheilocystydy do 200 µm długości	<i>Pluteus primus var purus</i>
13) kapelusz brązowy.....	14
13) kapelusz biały i lub kremowy.....	15
14) głównie drewno liściaste, zapach rzodkwi.....	<i>Pluteus cervinus</i>
14) drewno iglaste, warstwa lipidowa w hymenium, małe zarodniki.....	<i>Pluteus lipidocystis</i>
14) z cystydami 'magnus-type', zapach rzodkwi.....	<i>Pluteus cinerascens</i> (USA)
15) zapach rzodkwi.....	<i>Pluteus cervinus var albus</i>
15) bez zapachu lub inny niż rzodkwi.....	16
16) cheilocystydy obecne i łatwe do znalezienia.....	17
16) cheilocystydy bardzo mało lub brak.....	<i>Pluteus petasatus</i> (inl. <i>Pluteus pseudorobertii</i>)
17) zarodniki 6-9,5 × 4,5-7,0, cheilocystydy max 75 µm	<i>Pluteus nothopellitus</i>
17) zarodniki węższe 4-5(6), cheilocystydy w centrum blaszki większe	<i>Pluteus albineus</i>

główne źródła:

- Vellinga E. C. 1990. *Pluteus* In: C. Bas, Th. W. Kuyper, M. E. Noordeloos & E. C. Vellinga (eds), *Flora Agaricina Nederlandica. Critical monographs on families of agarics and boleti occurring in the Netherlands.* 2: 31–55. A. A. Balkema, Rotterdam.
- Justo A. & Castro M. L. 2007. *Pluteus nothopellitus* sp. nov. and a review of white species in *Pluteus* section *Pluteus*. *Mycotaxon* 102: 221–230.
- A. Justo & Castro M.L. 2007 Observations in *Pluteus* section *Pluteus* in Spain: two new records for Europe. *Mycotaxon* 102, 209–220
- Błażej Gierczyk1, Anna Kujawa & Tomasz Ślusarczyk 2014
Pluteus albineus (basidiomycota)—a new species for Poland. *Polish Botanical Journal* 59(1): 145–148.
- Heilmann-Clausen J. 2008. *Pluteus* Fr. In: H. Knudsen & J. Vesterholt (eds), *Funga Nordica. Agaricoid, boletoid and cyphelloid genera*, pp. 535–538. Nordsvamp, Copenhagen.

Wersja 2014.12.25 B